

# Nullstellenbestimmung mit dem Newtonverfahren

---

Für quadratische Gleichungen ist es immer möglich vorhandene Nullstellen mit dem Verfahren der quadratischen Ergänzung oder mit der p/q-Formel zu berechnen. Schon bei ganzrationalen Funktionen dritten Grades tauchen jedoch oft Schwierigkeiten auf.

Ist es nicht möglich die Nullstellen einer Funktion exakt zu berechnen, sollen nun Näherungen ermittelt werden.

Da wir im folgenden numerische Berechnungen durchführen müssen und uns dezimale Ergebnisse interessieren, stelle zunächst mit Definieren - Vereinfachungsoptionen - Genauigkeit den Modus auf Approximate.

```
#1: Precision := Approximate
```

## Aufgabe 1

Betrachte die durch

$$\#2: F(x) := x^3 - 3 \cdot x^2 + 3 \cdot x - 3$$

gegebene Funktion. Begründe, dass sie eine Nullstelle hat. Zeichne den Graphen und gib einen groben Näherungswert  $x_0$  für die Nullstelle an.

## Aufgabe 2

Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen von  $f$  im Punkt  $P(2.5 | f(2.5))$ . Ihre Nullstelle  $x_1$  ist ein Näherungswert für die gesuchte Nullstelle von  $f$ . Gib die Nullstelle der Tangente an.

## Aufgabe 3

Wende das Verfahren erneut an für die Tangente an den Graphen von  $f$  im Punkt  $Q(x_1 | f(x_1))$ .  $x_1$  ist dabei die Nullstelle der Tangente aus Aufgabe 2.

## Aufgabe 4

a) Leite allgemein eine Gleichung für die Nullstelle der Tangente an den Graphen im Punkt  $(x_n | f(x_n))$  her.

Damit kann der  $(n+1)$ -te Näherungswert aus dem  $n$ -ten Näherungswert berechnet werden. Es werden dabei immer wieder dieselben Rechenvorschriften angewendet. Ein solches Verfahren wird als iteratives Verfahren bezeichnet.

b) Führe einige Schritte des Newton-Verfahrens mit Excel durch. Erstelle und vervollständige dazu das folgende Datenblatt.

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <span style="font-size: small;">Arial 12</span> <span style="float: right;"> </span> </div>						
C2		=B2^3-3*B2^2+3*B2-3				
	A	B	C	D	E	F
1	n	$x_n$	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$f(x_n)/f'(x_n)$	$x_{n+1}$
2	0	2,5	1,375	6,75	0,203704	2,2963
3	1	2,2963				

**c)** Informiere Dich in der Derive-Hilfe über den iterates- und den iterate-Befehl und führe damit Näherungsberechnungen für die Nullstelle von  $f$  durch. Vergleiche das Ergebnis mit der von Derive approximierten Lösung von  $f(x)=0$ .

---